



ENCUESTA NACIONAL SOBRE MANEJO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Arantxa Berzosa, Cristina Epalza, José Antonio Couceiro, Luis Escosa, María Espiau,
Lola Falcón, Clàudia Fortuny, Antoni Noguera-Julián, José Tomás Ramos Amador,
Beatriz Ruiz, Pere Soler-Palacín, María Luisa Navarro, **Grupo Trabajo VIH e ITS SEIP**

Contacto: arantxa.berzosa@gmail.com



INTRODUCCIÓN


Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud global. En nuestro medio, aumentan de forma progresiva desde 2016.



Los adolescentes constituyen un grupo de riesgo:

- Razones biológicas
- Hábitos conductuales
- Limitación acceso a sistema sanitario

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ESPAÑA, 2021




Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica



INTRODUCCIÓN

Los pediatras juegan un papel fundamental en la educación sanitaria y deben promover la prevención de estas infecciones en su actividad asistencial.

OBJETIVO





METODOLOGÍA



Grupo de trabajo de VIH e ITS



Encuesta electrónica



Google Forms



Profesionales de la salud que atienden adolescentes entre 10-19 años.





METODOLOGÍA

Se analizaron:


1. La capacitación autorreportada
2. Los conocimientos sobre ITS
3. Los cambios epidemiológicos percibidos en su práctica asistencial
4. Las demandas de los profesionales.




RESULTADOS

418 profesionales

Mediana edad 44 años
(RIC 34.8-54)




■ Mujeres
■ Hombres




■ A Primaria
■ A Hospitalaria

Nº consultas




Consultas ITS




■ Han aumentado
■ Atienden las mismas
■ NS/NC

45.5% PAH vs 20% PAP, $p < 0.05$

Capacitación autorreportada



Unidades de apoyo






RESULTADOS

2. Conocimientos objetivos

PAH PAP




* p<0.05



RESULTADOS

Abordaje sexualidad e ITS



- Cuestión índole familiar y personal
- Tratarse de forma proactiva



Una minoría dispone de espacio adecuado para abordarlas
(25% PAH vs 36% PAP, $p < 0.05$)



O cuenta con el tiempo necesario para poder abordarlas
(17.8% PAH vs 9.3% PAP, $p < 0.05$)



Tienen capacidad para realizar la exploración y recoger las muestras adecuadamente
(39.5% PAH vs 29.3% PAP, $p < 0.05$).



RESULTADOS




Los profesionales
sanitarios **demandan**

Formación práctica sobre
sexualidad e ITS en
adolescentes (89.2%)

Manuales actualizados
sobre sexualidad e ITS en
adolescentes (90.9%)

Material didáctico para
abordar estos temas en la
consulta (86.2%)





CONCLUSIONES

Esta encuesta pone de manifiesto la necesidad de:

- ✓ Reforzar la formación sobre sexualidad e ITS de los profesionales sanitarios que atienden a adolescentes, tanto en ámbito hospitalario como atención primaria.
- ✓ Mejorar el espacio-tiempo que requiere su atención en la práctica clínica diaria.
- ✓ Ofrecer un mejor abordaje global de las ITS en esta población especialmente vulnerable